

მცენარეთა ღაცვა

Plant protection

et Schiff.),
chrysorrhoea L.)

(*Archips rosana* L.),
(*Lymantria dispar* L.).

(*Recurvaria nanella* den.
(*Euproctis*

1. - *Recurvaria nanella* den. et Schiff

... (1969-2004) ... (1979) ...

24-28 (

20-25

18-22⁰ 15 (180), - 25 (270 5 (250), 70-

75

15 120-130 10-

45%,

25-35%, - 10-15%.

45-40%, 30-35%, - 20-25%. 12

Ichneumonidae - *Prisfomerus vulnerator* Grav., *Scambus calobata* Grav.
Braconidae - *Hormius monilatus* Nees., *Bracon hebetor* Say., *B. variegator* Spin., *B. telengai* Mularsk., *Meteorus rubens* Nees., *Macrocentrus collaris* Spin., *Orgilus laetvigator* Nees., *Mikrodus dimidiator* Nees., *Ascogaster quadridentata* Wesm. **Tachinidae** - *Nemorilla floralis* Fll.

2. - Archips rosana L

(1975-

2004).

15-22

18-20

(2010 - 2011)

18⁰

2-3

34-38
10-15

1200-2000

15

30

75

5

(20)

20-30

(140-200)

10

(80)

15

(25)

10

30

(120-160)

10

(75)

30

10

(100-120)

(140-200)

18-20⁰

2010-2011

()

15-18

40-45 %

14-18 %

16

Ichneumonidae - *Pimpla spuria* Grav., *Itoplectis maculator* F., *Pristomerus vulnerator* Grav., *Nythobia armillata* Grav., *Scambus calobata* Grav.
Braconidae - *Bracon hebetor* Say., *Rogas geniculator* Nees., *Meteorus rubens* Nees., *Macrocentrus collaris*

Spin., *Orgilus laevigator* Nees., *Microdus rufipes* Nees., *Ascogaster quadridentatus* Wesm. . **Chalcidoidea** -
Brachymeria intermedia Nees. . **Elasmidae** - *Elasmus albipennis* Thoms. . Trichogrammatidae -
Trichogramma cacoecia March. . **Tachinidae** - *Nemorilla floralis* Fll.,

3. - *Spilota ocellana* F

14-18 9-12 7-10
 10-12⁰ 15-20
 ()
 12-15
 2010-2011 8-10 ()
 (1600)
 60 , 80 , 70
 (1500-2000)
 ()
 400 8-12
 30-35%,
 45%.

8 : **Ichneumonidae** - *Itopectis maculator* F., *Pristomerus vulnerator* Grav., *Scambus brevicornis* Grav.,
Braconidae - *racon hebetor* Say., *Microdus dimidiator* Nees., *Ascogaster quadridentata* Wesm., *Chelonus oculator* Panz.,
Tachinidae - *Nemorilla floralis* Fll.

4. - *Euproctis chrysorrhoea* L

6-8 (150 300) ()
 16⁰ 74 %
 50-55 4-5 ,
 5-6 30-35 3-5
 20-22⁰ (250-280 .)
 18-20 () 22-
 26

9 : **Ichneumonidae** - *Agrypon flaveolatum* Grav., *Pristomerus vulnerator* Grav., *Scambus brevicornis* Grav. **Braconidae** - *Rogas geniculator* Nees., *Meteosus versicolor* Wesm., *Apanteles tibialis* Curt. **Torriniidae** - *Monodontomerus obsoletus* F. **Elasmidae** - *Elasmus albipennis* Thoms. **Tachinidae** - *Agria mamillata* Pand.,

5. - *Lymantria dispar* L.

45-50

18-22

10 : **Ichneumonidae** - *Pimpla spuria* Grav., *Itoplectis alternans* Grav., *I. maculata* F., *Ichneumon sarcitorius* L. **Braconidae** - *Meteosus versicolor* Wesm., *Apanteles tibialis* Curt., *A. laevigatus* Ratz. **Chalcidoidea** - *Brachymeria intermedia* Nees., **Torymidae** - *Monodontomerus obsoletus* F. **Tachinidae** - *Exorista lasvarum* L.

3-

4-

(20-22)

(800).

. 1 %

1-2-

Dermestes ater *D. lardarius*.

2014

